



### UDBYTTEPOTENTIALE

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

### GULRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

### SEPTORIA

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

### MELDUG

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

### BRUNRUST

Lav modtag.				Modtagelig
-------------	--	--	--	------------

### STRÅSTYRKE


Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

### TIDLIGHED

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

### ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9		15/9		10/10
-----	--	------	--	-------



### EGENSKABER

- Højtydende vinterhvede med højt proteinindhold
- Kan dyrkes på alle jordtyper, dog ikke velegnet på vandlidende arealer
- Eneste sort med kort stift strå, resistent mod kormmosaikvirus
- Højt udbyttepotentiale uanset såtidspunkt. Egner sig godt til tidlig såning
- Enkeltakstype - kendetegnet ved åben vækst og mange store kerner pr. aks

FORÆDLER: **Nordic Seed**

### FAKTA

År	Kerneudbytte*	Kerneudbytte**	Proteinudbytte*	Proteinudbytte**	Stivelse i tørstof	Hektolitervægt	Observationsparceller			
							Meldug	Septoria	Gulrust	Lejesæd
	fht	fht	kg./ha	kg./ha	(%)	(kg/hl)	(%)	(%)	(%)	(kar. 0-10)
2018	100	100	769	671	71,5	78,3	9	-	0,01	0,0
2017	98	98	914	915	71,5	73,3	7	19	0,02	0,0
2016	104	100	889	849	69,8	74,7	11	13	1,0	0,7

\*Landsforsøg. \*\*Supplerende landsforsøg.

Kilde: Landsforsøg.

### PLANTEVÆRN

Vækststadium	St. 12-15	St. 29-31	St. 32	St. 39	St. 53-65
Svampe sygdomme		Ved tidlige meldugangreb: Anvend 0,2-0,25 l Talius	Ved angreb af meldug, gulrust og septoria: Anvend 25-30% normaldosering af en bredspektret løsning. Tilsæt 0,15 l Talius hvis samtidig meldug.	Anvend 50% normaldosering af en stærk løsning mod septoria, gulrust og hvedebladplet. Risikoen for hvedebladplet (DTR) er størst ved pløjefri dyrkning og samtidig hvede efter hvede.	Anvend 30-40% normaldosering af en stærk løsning mod septoria, brunrust og evt. aksfusarium.
Vækstregulering*		0,5 l CCC + 0,1 l Modus M. eller anvend løsning i st. 32.	Alternativt 0,2-0,3 l Modus M.		
Skadedyr	Hvis tidlig såning og evt. behov for forebyggelse af havrerødsot: Anvend 0,15 kg Karate 2,5WG eller 0,10 l Mavrik Vita.				Ved 25-50% angrebne strå af bladlus: Anvend 0,15 kg Karate 2,5WG eller 0,10 l Mavrik Vita.

\*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder



### Udviklingsstadier

