

# SORTIMENT TIL MFO-EFTERAFGRØDER, PLIGTIGE-, HUSDYR- OG MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER

## EFTERAFGR.GRÆS, KORN

### ALM. SILDIG RAJGRÆS, PLÆNETYPE

#### VÆKSTMØNSTER VED UNDERSÅNING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

#### DÆKNINGSGRAD TIDLIGT EFTERÅR

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

#### RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

#### VINTERFASTHED

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

#### EGENSKABER

- Langsom svag vækst indtil høst af hovedafgrøden
- Dækkende vækst efter høst af kornafgrøder
- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

#### FAKTA

Græs som efterafgrøde	Alm. sildig rajgræs, plænetype
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	X
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle, undtagen frøgræs
TKV	3-4
Kg/ha	8-10



## EFTERAFGR.GRÆS, MAJS

### ALM. SILDIG RAJGRÆS, FODERTYPE

#### VÆKSTMØNSTER VED UNDERSÅNING

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

#### DÆKNINGSGRAD EFTERÅR

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

#### RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

#### VINTERFASTHED

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

#### EGENSKABER

- Høj vinterfasthed
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper

#### FAKTA

Græs som efterafgrøde	Alm. sildig rajgræs, fodertype
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	X
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle, undtagen frøgræs
TKV	3-4
Kg/ha	8-10



## MFO BLÅGUL

### OLIERÆDDIKE OG HONNINGURT

#### VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

#### DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

#### BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

#### RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

#### ETABLERINGSTIDSPUNKT


Juli				August
------	--	--	--	--------

#### EGENSKABER

- Hurtig og god dækkende vækst
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper
- Dyb rodvækst
- Frøene af honningurt er coatede for bedre spredbarhed

#### FAKTA

Som efterafgrøde	MFO Blågul (Olieræddike og honningurt)
MFO-efterafgrøder	X
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle
TKV	-
Kg/ha	10-15
Honningurt coated	X



## MFO 90-10

### OLIERÆDDIKE OG GUL SENNEP

#### VÆKSTMØNSTER

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

#### DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

#### BLOMSTRING

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

#### RODDYBDE

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

#### ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli				August
------	--	--	--	--------

#### EGENSKABER

- Høj reduktionseffekt af roecystenematoder
- Hurtig og god dækkende vækst
- Kan opfylde alle efterafgrødetyper
- Dyb rodvækst

#### FAKTA

Som efterafgrøde	MFO 90-10 (Olieræddike* og gul sennep)
MFO-efterafgrøder	X
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle, undtagen raps
TKV	-
Kg/ha	10-15

\* Obs ikke dobbeltneematoderesistent.

