

# SORTIMENT TIL PLIGTIGE-, HUSDYR- OG MÅLRETTEDE EFTERAFGRØDER (IKKE TIL MFO-EFTERAFGRØDE)

## ATLANTIS

**OLIERÆDDIKE - DOBBELT NEMATODERESISTENT**

**VÆKSTMØNSTER**

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

**DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING**

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

**BLOMSTRING**

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

**RODDYBDE**

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

**REDUKTIONSEFFEKT FLERE NEMATODER**

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

**ETABLERINGSTIDSPUNKT**

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Høj reduktion af nematoder – dobbeltnematoderesistent
  - Reduktionseffekt overfor: roecystenematoder, rodgallenematoder, rodlæssionsnematoder og fritlevende nematoder
  - Hurtig og dækkende vækst, høj kvælstofoptagelse

**FAKTA**

Som efterafgrøde	Atlantis (Dobbelt nematoderesistent)
Nematoderesistens	X
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Alle, inkl. roer og kartofler
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



## GUILLOTINE

**OLIERÆDDIKE - NEMATODERESISTENT**

**VÆKSTMØNSTER**

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

**DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING**

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

**BLOMSTRING**

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

**RODDYBDE**

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

**REDUKTIONSEFFEKT ROECYSTENEMATODER**

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

**ETABLERINGSTIDSPUNKT**

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Høj reduktion af roecystenematoder
  - Hurtig og dækkende vækst, dyb rodvækst
  - Høj kvælstofoptagelse
  - Stor bladmasse

**FAKTA**

Som efterafgrøde	Guillotine (Roecystenematoderesistent)
Nematoderesistens	X
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps, roer
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



## RUTINA

**OLIERÆDDIKE**

**VÆKSTMØNSTER**

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

**DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING**

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

**BLOMSTRING**

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

**RODDYBDE**

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

**REDUKTIONSEFFEKT NEMATODER**

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----


**ETABLERINGSTIDSPUNKT**

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Hurtig og dækkende vækst
  - Stor bladmasse
  - Dyb rodvækst
  - Høj kvælstofoptagelse

**FAKTA**

Som efterafgrøde	Rutina
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15



## SILETINA

**OLIERÆDDIKE**

**VÆKSTMØNSTER**

Langsom				Hurtig
---------	--	--	--	--------

**DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING**

Moderat				Kraftig
---------	--	--	--	---------

**BLOMSTRING**

Tidlig				Sen
--------	--	--	--	-----

**RODDYBDE**

Øverlig				Dyb
---------	--	--	--	-----

**REDUKTIONSEFFEKT NEMATODER**

Lav				Høj
-----	--	--	--	-----

**ETABLERINGSTIDSPUNKT**

Juli				August
------	--	--	--	--------

- EGENSKABER**
- Hurtig og dækkende vækst
  - Stor bladmasse
  - Dyb rodvækst
  - Høj kvælstofoptagelse

**FAKTA**

Som efterafgrøde	Siletina
Nematoderesistens	-
MFO-efterafgrøder	-
Øvrige efterafgrøder	X
Kan indgå i sædskifter	Korn, frø, raps
TKV	10,5-11,5
Kg/ha	10-15

