

INFORMER

VINTERHVEDE FORÆDLER: SAATZUCHT JOSEF BREUN



Egenskaber:

- Stabil højtydende sort
- Højt proteinudbytte og faldtal
- Lav modtagelighed for alle sygdomme
- Resistent mod alle kendte gulrustracer
- Meget langt strå - god ukrudtskonkurrence
- God stråstyrke

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

GULRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

SEPTORIA

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

MELDUG

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

BRUNRUST

Lav modtag.					Modtagelig
-------------	--	--	--	--	------------

STRÅSTYRKE

Lav					Høj
-----	--	--	--	--	-----

TIDLIGHED

Tidlig					Sen
--------	--	--	--	--	-----

ETABLERINGSTIDSPUNKT

1/9					10/10
-----	--	--	--	--	-------

FAKTA KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	KERNE- UDBYTTE* (fht)	KERNE- UDBYTTE** (fht)	PROTEIN- UDBYTTE* (kg./ha)	PROTEIN- UDBYTTE** (kg./ha)	HEKTO- LITERVÆGT (kg./hl)	STIVELSE I TØRSTOF (%)	MERUDB. FOR SVAMPE- BEKÆMPELSE (hkg./ha)	OBSERVATIONSPARCELLER				
								MELDUG (%)	SEPTORIA (%)	GULRUST (%)	LEJESÆD (kar. 0-10)	STRÅLÆNGDE (cm)
2020	100	98	1.007	896	80,8	70,2	7,1	0,8	3,4	0,0	0,0	92,0
2019	104	103	970	913	76,6	70,4	9,3	2,1	3,2	0,0	0,0	95,0
2018	101	104	832	759	80,8	70,3	-3,7	1,0	-	0,0	1,0	77,0

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg. Kilde: Sortinfo.dk

Dyrkningsforhold økologisk vinterhvede

Økologisk vinterhvede lykkes bedst på svær jord, ler eller dynd, mens sand- og humusjorder er mere usikre. Dyrkning på let jord kan dog sikres ved vanding. På sandjord er økologisk vinterhvede ikke en optimal afgrøde, da udbyttet er 5-7 hkg/ha lavere end i vinterrug og vintertriticale.

En god placering af vinterhvede i sædskiftet er efter raps, bælgæd, kartofler, frøgræs, kløvergræs, lucerne eller havre. De øvrige kornarter er ikke egnede forfrugter. På grund af udvaskningsrisikoen ved efterårspløjet kløvergræs og lucerne bør vinterhvede kun placeres efter disse forfrugter på lerjord i nedbørsfattige områder.

Af hensyn til ukrudtskonkurrencen bør hveden først sås i den sidste uge af september. Ved et højt ukrudtstryk i marken anbefales det at udsætte såningen til begyndelsen af oktober. Såningen bør ikke foretages senere, da udbyttepotentialet herefter vil falde væsentligt.