


# ATLANTIS TIL ROE- OG KARTOFFELSÆDSKIFTER

## OLIERÆDDIKE, DOBBELT NEMATODERESISTENT



### VÆKSTMØNSTER

Langsom Hurtig

### DÆKNINGSGRAD VED RETTIDIG ETABLERING

Moderat Kraftig

### BLOMSTRING

Tidlig Sen

### RODDYBDE

Øverlig Dyb

### REDUKTIONSEFFEKT, FLERE NEMATODER

Lav Høj

### ETABLERINGSTIDSPUNKT

Juli August

### EGENSKABER

- Høj reduktionseffekt overfor både roecystenematoder, rodgalle-nematoder, rodlæssionsnematoder og fritlevende nematoder
- Hurtig og dækkende vækst ved god etablering inden ca. 20. august
- Dyb rodvækst og høj kvælstofoptagelse
- Velegnet i kartoffelsædskifter
- Kan anvendes til opfyldelse af alternativet "Mellemafgrøder"

Olieræddike har et lavt C/N-forhold, som giver en hurtigt frigivelse af kvælstof til den efterfølgende afgrøde i foråret. Den udvintrer normalt hen over vinteren og er velegnet på især lerede jordtyper.

I modsætning til andre korsblomstrende arter opformerer olieræddike kun kålbrot i meget begrænset omfang. Da olieræddike er en meget effektiv efterafgrøde anbefales at tage de angivne dyrkningstiltag i tabellen nedenfor i brug, så olieræddike fortsat kan indgå som efterafgrøde i rapssædskifter.

### FAKTA

	NEMATODERESISTENS (DOBBELT NEMATODERESISTENS)	MFO-EFTER-AFGRØDER*	ØVRIGE EFTER-AFGRØDER	KAN INDGÅ I SÆDSKIFTER**	TKV	KG/HA
Atlantis	x	-	x	Alle, inkl roer og kartofler	10,5-11,5	10-15***

\*) Kan ikke opfylde kravene til MFO-efterafgrøde i renbestand, men kan indgå i blanding med anden godkendt art, f.eks. havre.

\*\*\*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.

\*\*\*) Udsædsmængder op mod 25 kg/ha vil øge reduktionen af nematoder.

### OVERSIGT OVER DYRKNINGSFAKTORER, DER FREMMER KÅLBROK

DYRKNINGSFAKTORER DER FREMMER KÅLBROK	BETYDNING*
Sædskifte med hyppig raps	XXXXX
Gul sennep som hyppig efterafgrøde	XXXX
Rapspildplanter efter høst	XX
Korsblomstret ukrudt	XX
Fugtige pletter i marken	XX
Lave reaktionstal	XX
Meget tidlig såning	XX
Hyppig dyrkning af kålbrotresistente rapssorter	xx til xxxxx
Olieræddike som efterafgrøde	x til ?
Manglende rengøring af maskiner/redskaber for jord	Bringer smitte ind i marken

\*Antallet af X'er indikerer risikoen. Jo flere X'er, jo større risiko.

Kilde: Landbrugsinfo, SEGES