

KWS IRINA

VÅRBYG

FORÆDLER: KWS LOCHOW GMBH



EGENSKABER

- Anerkendt ældre sort
- Lav hektoliter vægt
- Middel sygdomsmodtagelighed
- Høj stråstyrke
- Dobbelt nematoderesistent

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

HEKTOLITERVÆGT

Lav Høj

BYGRUST

Lav modtag. Modtagelig

BYGBLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

SKOLDPLET

Lav modtag. Modtagelig

STRÅNEDKNÆKNING

Lav Høj


AKSNEDKNÆKNING

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KORN UDVIKLINGSSTADIER (St.)



FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG						OBSERVATIONSPARCELLER								
	KERNE- UDBYTTE	KERNE- UDBYTTE	RÅ- PROTEIN	RÅ- PROTEIN	SORTERING AF KERNER OVER 2,5 MM	HEKTO- LITERVÆGT	LEJESÆD	AKSNED- KNÆKNING	STRÅNED- KNÆKNING	MELDUG	BYGRUST	SKOLDPLET	BLADPLET	RAMULARIA	
	fht*	fht**	% ts*	% ts**	%	kg/hl	Karakter 0 - 10			% dækning					
2021	99	98	10,7	11,2	95,0	66,4	0,0	1,3	1,0	0,0	14,0	2,9	0,1	12,0	
2020	99	98	10,4	10,3	97,0	67,9	0,0	2,7	1,0	0,0	11,0	4,3	0,0	35,0	
2019	97	99	11,8	11,1	95,0	65,3	0,2	1,5	3,0	0,0	14,0	1,8	0,1	27,0	
GNS 2019- 2021	98	98	10,9	11,0	95,7	66,5	0,1	1,8	1,7	0,0	13,0	3,0	0,1	24,7	

*Landsforsøg. **Supplerende landsforsøg

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	St. 32 - 37	St. 49 - 53
SVAMPESYGDOMME	Ved højt sygdomstryk: 0,25 l/ha Prosaro.	0,4 l/ha Propulse + 0,2 l/ha Comet Pro.
VÆKSTREGULERING*	Ved højt N-niveau og/eller kraftig afgrøde: 0,25 l/ha Moddus M.	0,15-0,2 l/ha Cerone.
SKADEDYR	Ved forekomst af kornbladbillelarver og/eller bladlus: 0,15-0,2 kg/ha Lamdex.	

*Vækstreguler aldrig stressede afgrøder.