

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Brogede blomster - tanninholdig
- Middel til sen modning

FAKTA

ÅR	UDBYTTEFORSØG				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN	TKV	AFGRØDEHØJDE VED HØST	LEJES/ÆD
	fht*	% ts*	g	cm	karakter 0 - 10
2021	105	27,8	507,0	80,0	0,8
2020	98	28,9	559,0	136,0	0,6
2019	107	27,5	601,0	122,0	0,0
GNS 2019-2021	103	28,1	555,7	112,7	0,5

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPIRINGSFASEN	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		0,3 l/ha Pictor Active + 0,25 l/ha Orius Max*. Under fugtige forhold bør der anvendes samme behandling senere i blomstringsfasen.
SKADEDYR	Ved forekomst af kåltrips og/eller bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.	Ved mere end 10-15% angrebne planter med bladlus: 0,2 l/ha Mavrik. Evt. behov for opfølgning.

* Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.