

LYNX

HESTEBØNNE

FORÆDLER: NPZ



EGENSKABER

- Højt udbytte over flere år
- Lav modtagelighed for vikkeskimmel
- Højt proteinindhold
- Høj stængelstyrke
- Middeltidlig til sen modning

UDBYTTEPOTENTIALE

Lav Høj

RÅPROTEIN

Lav Høj

CHOKOLADEPLET

Lav modtag. Modtagelig

BLADPLET

Lav modtag. Modtagelig

VIKESKIMMEL

Lav modtag. Modtagelig

STÆNGELSTYRKE

Lav Høj

MODNING

Tidlig Sen

KONVENTIONEL AFPRØVNING

ÅR	UDBYTTEFORSØG*				
	KERNEUDBYTTE	RÅPROTEIN I TØRSTOF	TKV	PLANTEHØJDE	LEJESÆD
	fht	% af ts	g	cm	karakter 0-10
2022	107	29,0	555,0	115,0	0,3
2021	105	27,8	494,0	80,0	0,8
2020	98	28,6	519,0	136,0	0,6
2020-2022	103	28,5	522,7	110,3	0,6

*Landsforsøg.

Kilde: Sortinfo.dk

PLANTEVÆRN

BEHANDLING / VÆKSTSTADIE	FREMSPRINGSFASEN	BLOMSTRINGSFASEN
SVAMPESYGDOMME		0,3 l/ha Pictor Active + 0,25 l/ha Orius Gold.* Under fugtige forhold bør der anvendes samme behandling senere i blomstringsfasen.
SKAEDYR	Ved forekomst af kåltrips og/eller bladrandbiller: 0,15 kg/ha Lamdex.	Ved mere end 10-15% angrebne planter med bladlus: 0,2 l/ha Mavrik. Evt. behov for opfølgning.

* Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.